

# Austritt wichtiger Hautnerven aus der Körperfaszie

## Kopf

<b>N. supraorbitalis (N. V<sub>1</sub>)</b>	oberer Ursprungsbereich des M. orbicularis oculi
<b>N. infraorbitalis (N. V<sub>2</sub>)</b>	unterhalb des M. orbicularis oculi
<b>N. zygomaticofacialis (N. V<sub>2</sub>)</b>	unterer Ursprungsbereich des M. orbicularis oculi
<b>N. zygomaticotemporalis (N. V<sub>2</sub>)</b>	lateral Ursprungsbereich des M. orbicularis oculi
<b>N. auriculotemporalis (N. V<sub>3</sub>)</b>	vor der Ohrmuschel, parallel zur A. temporalis superficialis
<b>N. buccalis (N. V<sub>3</sub>)</b>	medialer Rand des M. masseter
<b>N. mentalis (N. V<sub>3</sub>)</b>	lateral Kinnbereich

## Hals

<b>N. occipitalis major (R. dorsalis C2)</b>	Mittelpunkt zwischen Linea mediana posterior und Ohrmuschel, medial der A. occipitalis
<b>N. occipitalis tertius (R. dorsalis C3)</b>	nahe Proc. spinosus C2
<b>N. occipitalis minor</b>	Hinterrand des M. sternocleidomastoideus (Erb'scher Punkt)
<b>N. auricularis magnus</b>	Hinterrand des M. sternocleidomastoideus (Erb'scher Punkt)
<b>N. transversus colli</b>	Hinterrand des M. sternocleidomastoideus (Erb'scher Punkt)
<b>Nn. supracalviculares</b>	Hinterrand des M. sternocleidomastoideus (Erb'scher Punkt)

## Rumpf

<b>Rr. cutanei posteriores (Rr. dorsales)</b>	einige Zentimeter lateral der Procc. spinosi (Rr. mediales), im unteren Rückenbereich auch etwa in der Mitte zwischen Linea mediana posterior und hinterer Axillarlinie (Rr. laterales)
<b>Rr. cutanei laterales (Rr. ventrales)</b>	vordere Axillarlinie
<b>Nn. clunium superiores (Rr. dorsales)</b>	dorsale Crista iliaca
<b>Nn. clunium medii (Rr. dorsales)</b>	im Bereich des sakralen Ursprungs des M. gluteus maximus

## Obere Extremität

<b>N. cutaneus brachii lateralis superior (N. axillaris)</b>	dorsaler Unterrand des M. deltoideus
<b>N. cutaneus brachii posterior (N. radialis)</b>	medial des N. cutaneus brachii lateralis superior
<b>N. cutaneus brachii medialis mit N. intercostobrachialis</b>	Axilla
<b>N. cutaneus brachii lateralis inferior (N. radialis)</b>	auf halber Höhe des Oberarms, dorsal lateral
<b>N. cutaneus antebrachii posterior (N. radialis)</b>	lateral der Trizepssehne
<b>N. cutaneus antebrachii medialis</b>	zusammen mit V. basilica (Hiatus basilicus)
<b>N. cutaneus antebrachii lateralis (N. musculocutaneus)</b>	lateral der Bizepssehne
<b>R. superficialis n. radialis</b>	oberhalb des Handgelenks, palmar radial
<b>R. dorsalis n. ulnaris</b>	oberhalb des Handgelenks, palmar ulnar
<b>R. palmaris n. mediani</b>	oberhalb des Handgelenks, palmar mittig

## Untere Extremität

<b>N. cutaneus femoris posterior mit Nn. clunium inferiores</b>	Unterrand des M. gluteus maximus
<b>N. iliohypogastricus</b>	2 cm oberhalb des Anulus inguinalis superficialis
<b>N. ilioinguinalis mit Nn. scrotales anteriores</b>	Anulus inguinalis superficialis
<b>R. femoralis n. genitofemoralis</b>	unter dem Leistenband im Bereich des Hiatus saphenus
<b>N. cutaneus femoris lateralis</b>	oberes Drittel des Oberschenkels, ventral lateral
<b>N. saphenus mit R. infrapatellaris</b>	medial der Patella im Verlauf der V. saphena magna
<b>N. cutaneus surae lateralis (N. fibularis)</b>	unterhalb der Kniekehle, lateral
<b>N. cutaneus surae medialis bzw. N. suralis (N. tibialis)</b>	auf halber Höhe des Unterschenkels im Verlauf der V. saphena parva
<b>N. fibularis superficialis</b>	unteres Drittel des Unterschenkels, ventral lateral